

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

胃苓湯エキス錠クラシエ

(イレイトウ)

特 徴

- 「胃苓湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「古今医鑑」^{コキンイカン} 泄瀉^{セツヤ}門に収載されている薬方です。胃がもたれて消化不良の傾向に用いられる「平胃散」^{ヘイイサン}という処方と、のどが渇いて、尿量が少なく、吐き気、むくみなどの症状があるときに用いられる「五苓散」^{ゴレイサン}という処方を合方したものです。
- 水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少の症状を伴う人の冷え腹、腹痛、急性胃腸炎、暑気あたり、食あたりに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1 ヶ月位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、食あたり、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合

効 能

水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症：食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛



食あたり



腹痛

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。
胃苓湯エキス粉末 …………… 1,600mg

ソウジュツ・コウボク・チョレイ・タクシャ・ビャクジュツ・
ブクリョウ・チンピ各1.25g、ケイヒ1.0g、タイソウ・ショウキョ
ウ各0.75g、カンゾウ0.5gより抽出。

添加物として、乳糖、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、
メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少
異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい
所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでくだ
さい。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがあり
ますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでくだ
さい。
- (6)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、
2日をすぎた場合には服用しないでください。



健康アドバイス

● ゆっくりかんで 食べる



偏食や欠食を避け、さま
ざまな食材のものを、ゆ
っくりとよくかんで食べ
るようにしましょう。胃
腸の調子よくなると、
からだのむくみも気にな
らなくなります。

● 水分を取り すぎない



水分をとりすぎると、消
化する力が衰え、むくみ
などの原因になります。
特に夕食後は、お茶やジ
ューズ、果物などの水分
をとりすぎないように気
をつけましょう。

● 食事はバランスよく



朝食を抜いたり、特定の
ものだけを食べていると、
栄養のバランスをくずし
ます。偏食や食べすぎを
避け、バランスのとれた
食事を心がけましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元

クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ製薬株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)