

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方調胃承気湯エキス顆粒 (チョウイジョウキトウ)

特 徴

- 「調胃承気湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」^{ショウカンロン}に記載されている薬方で、便秘に用いられています。
- 「調胃承気湯」とは胃腸を整え、胃腸の働きを良くするという意味で、食欲があるのに大便がすっきりと出ないという便秘のタイプによく用いられています。
- 慢性および急性の便秘に対して、おだやかに、すぐれた排便効果を発揮いたします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の方は服用しないでください
生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(5) 高齢者
(6) 次の症状のある人
むくみ
(7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

効 能

便秘

用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	2回
15才未満7才以上	2／3包	
7才未満4才以上	1／2包	
4才未満2才以上	1／3包	
2才未満	1／4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成 分

成人1日の服用量2包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。

調胃承気湯エキス粉末 ……………1,100mg
〔ダイオウ2.5g、カンゾウ1.0g、乾燥硫酸ナトリウム0.5gより〕
抽出。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Mg、二酸化ケイ素を含有する。

〈成分に関連する注意〉

- (1)本剤に含まれるダイオウにより、尿が橙色ないし、赤色になることがあります。
- (2)本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）